

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 髮簪(步搖)流行於①明朝②唐朝③元朝④宋朝。
2. (1) 無刺激性、有安撫鎮靜作用的保養品較適用於①敏感性②中性③乾性④油性 皮膚。
3. (3) 預防皮膚病傳染，下列何者為不妥：①器械消毒②工作前後洗手③使用消炎藥膏④保持皮膚完整勿產生傷口。
4. (2) 在修指甲時，指甲外皮被割傷，應先用①防腐劑②消毒劑③腐蝕劑④小蘇打。
5. (1) 頭皮屑是頭皮①角質層②顆粒層③基底層④有棘層 不斷剝落所造成。
6. (3) 黛安娜的髮型是①向心②外心③離心④中心 式的髮型設計。
7. (4) 短髮時欲燙出自然的波紋可用①拐子②螺絲③龍鳳④夾捲 燙。
8. (3) 一般來說①歐洲人②美洲人③亞洲人④澳洲人 的頭髮，染髮劑較難滲入皮質層內與麥拉寧色素粒子結合。
9. (4) 不良化粧品可能導致婦女在面頰或額頭產生①肝斑②雀斑③老人斑④黑斑。
10. (2) 捲髮排列的技巧最好以①標準捲法②髮型設計排列③自由發揮④隨顧客意見。
11. (2) 欲配製 6%煤鹵油酚肥皂液 0.5 公升需取含 25%甲苯酚之煤鹵油酚原液多少 cc？①25②60③250④6。
12. (4) 指甲變成紫色表示①缺營養②發炎③感染④缺氧。
13. (3) 在平面上左右有大小兩點，在視覺上會由右邊移向左邊，則兩點為①一樣小②一樣大③右邊大左邊小④左邊大右邊小。
14. (3) 二股扭轉編髮是①跳躍式②水平式③移轉式④階梯式 的律動。
15. (3) 我們常用之「酒精」消毒係指何種物質之溶液①甲醇②丙醇③乙醇④丁醇。
16. (3) 一次操作剪下髮量最少的工具是①雙面打薄剪②單面打薄剪③短小剪刀④長剪刀。
17. (1) 粗糙性脫髮是缺乏①維生素 A、D②維生素 C、D③維生素 A、B④維生素 B₂、B₆ 所引起。
18. (2) 燙髮時第一劑若停置在頭髮的時間愈久，則會產生①亮麗的髮質②過度的膨脹③較持久的鬢度④均勻的波浪。
19. (3) 足以損害人體健康的化粧品，應禁止販賣或陳列，違者①處一萬二千元以下罰鍰②警告處分③處一年以下有期徒刑④吊銷營業執照。
20. (3) ①半頂髮笠②髮條③髮片④全頂髮笠 是在小部貼用或以不同的顏色配成花色頭髮時使用。
21. (2) 修飾指甲時，宜將手指浸泡在①微酸性②微鹼性③酸性④鹼性 水溶液中。
22. (1) 護髮霜的包裝可以無①備查字號②廠名③成分④廠址。
23. (1) 有關紫外線消毒下列敘述何者為錯誤①係屬游離輻射線②其波長愈短殺菌能力愈強③可用來消毒金屬類美髮器具④消毒條件為光度強度 85 微瓦特/cm² 以上，至少需 20 分鐘。
24. (4) 均等式剪髮較適合①圓形②方形③扁平形④橢圓形 頭型。
25. (4) 瘧疾是經何種方式傳染？①不潔飲食、飲水②空氣傳播③飛沫傳染④瘧蚊叮咬。
26. (1) 頭髮內的間充物質流失，易使頭髮造成①多孔性②油性③撥水性④中性。
27. (1) 使用疏剪刀修剪粗硬髮質，應離髮根①5 公分②2 公分③8 公分④11 公分 處剪。
28. (1) 欲配成彩色瀏海頭髮，宜以①髮片②髮條③小髮髻④半髮笠 貼用。
29. (3) 剪一直線髮型時①降低角度②提高角度③放鬆梳順④用力拉緊 才不致使耳下部分產生缺角。
30. (2) 膚色較白者可選用①任何顏色②較淡色③偏褐色④較深顏色 的染劑。

31. (4) 為形成水平式波紋，而做順時鐘方向平捲時，髮流宜先梳成呈①一直線②正 C③斜 C④反 C。
32. (1) 盤垣髻流行於①晉朝②秦漢③春秋戰國④三國 時期。
33. (3) 不能藉定期驗血，及早發現，防止散播的傳染病為①後天免疫缺乏症候群（愛滋病）②B 型肝炎③肺結核④梅毒。
34. (2) 頭髮中色素粒子較小的是①褐色②黃色③紅色④黑色。
35. (1) 持頂部區域髮片的手指與地面平行，而其他區域髮片手指與地面垂直的髮型是①高層次剪法②邊緣層次剪法③方型剪法④均等層次剪法。
36. (2) 欲配製 0.5% 陽性肥皂苯基氯卡鉍溶液 1 公升需取 10% 苯基氯卡鉍原液多少 cc①0.5②50③5④500。
37. (1) 鼻出血的止血法是捻緊鼻子軟組織部分，用口呼吸，患者位於坐姿，並使頭①略向前傾②向左偏③抬高④向後仰。
38. (2) 更換期的表皮細胞有再生能力亦有剝落現象，其週期大約為①30~50 天②15~28 天③20~30 天④7~10 天。
39. (3) 從業人員健康檢查的目的，下列何者為非①有利於從業人員本身，及早發現病因，及早治療②有利於顧客可減少被帶菌的從業人員傳染的機會③僅供應付衛生單位管理的目的，對從業人員及負責人無多大用處④可助於營業場所負責人了解其營業場所設備是否適當。
40. (1) 中餐桌次，主人宜座在①面向門口②門口左側③背向門口處④門口右側。
41. (3) 下列何者是由於角質層細胞過度脫落累積在頭皮上所引起的①皮脂瘤②禿頭症③頭皮屑④疥癬。
42. (3) 細線較能表現出①男性般粗獷感②活潑感③女性般柔弱感④堅定感。
43. (2) 營業場所剪下之毛髮宜①每週清掃一次②隨手投入垃圾桶或隨時清掃③任意棄置④打烊後一次清掃。
44. (4) ①溴酸鉀②硼砂③溴酸鈉④乙硫醇酸 是冷燙液第一劑的主要成份。
45. (3) 酸性燙髮藥水是利用下列何者使其達到催化作用？①氫②阿摩尼亞③熱④單乙醇鉍。
46. (1) 頭髮漂淡劑可使頭髮①去除色素②增加亮度③增加色素④減少亮度。
47. (4) 刷子類尤其是長毛刷子消毒法宜用①流動蒸氣法②煤餾油酚肥皂溶液③煮沸法④紫外線。
48. (4) 皮膚的色素細胞存在於①粒狀層②顆粒層③角質層④基底層 之中。
49. (4) 頭型愈大的人，其冷燙排列宜採①標準燙②螺絲燙③辮子燙④疊磚燙。
50. (4) 圓型臉若要分髮線，其髮線適合①短分線②短分線、長分線、斜分線均可③斜分線④長分線。
51. (3) 臉部按摩應順著①骨骼②毛孔的方向③肌肉的紋理④汗毛的生長方向。
52. (4) 將削刀壓放在夾有髮片的中指上，整齊切斷髮尾的是①縱削法②橫削法③斜削法④直削法。
53. (4) 蒸氣機水瓶內的石灰質可用①鹼②鹽③酒④醋 去除。
54. (2) ①多食油脂食物②避免照射紫外線③用力拉梳④高溫烘乾 可防止頭髮分叉。
55. (4) 進門禮儀①隨意②聽裡面有聲音就可進去③直接開門而進④先敲門等回音才進。
56. (4) 夾捲的圓環之①長度②寬度③方向④直徑 可決定頭髮波浪的寬度。
57. (4) 傳染淋病、梅毒或後天免疫缺乏症候群(愛滋病)最可能共同的原因是①共用刮鬍刀②使用抽水馬桶③手拉手④不安全的性行為。
58. (3) 毛髮的張力和彈性來自①色素層②表皮層③皮質層④髓質層。
59. (4) 燙髮用還原劑為使成型較快，宜塗佈後：①上蒸氣②包毛巾③用熱水泡熱再塗佈於髮捲④蓋塑膠帽。
60. (4) 調配化學消毒劑時應注意事項敘述何者正確：①量取溶液時眼與量筒刻度應成垂直位置②開啟瓶裝原液時瓶蓋應朝下放置③先取原液，再加入蒸餾水稀釋④若手、眼皮膚接觸具侵蝕性消毒水宜以大量清水沖清。
61. (3) 急救箱內應備有①紅藥水②氨水③優碘④白花油 來消毒傷口。

62. (4) 頭髮的組成胺基酸中，最重要的是①精胺酸②絲胺酸③甘胺酸④胱胺酸。
63. (2) 指甲油宜用①雙氧水②丙酮③氨水④氯化鈉 去除。
64. (3) 一人施救心肺復甦術開始後要①每三分鐘檢查一次②做五分鐘再檢查③做完四個週期後檢查脈搏五秒鐘④做累了休息一下再做。
65. (2) 髮片提 45°捲入髮筒時，髮筒落在底盤的①內外各半②下方③上方④內方。
66. (2) 冷燙時，為預防藥劑傷害臉部肌膚的錯誤處理是①於髮緣四週圍毛巾②於髮緣四週先塗上中和水③於髮際邊的皮膚塗上護髮霜④於接近髮緣的皮膚塗抹凡士林。
67. (1) 髮型不易乾或不易梳理的主要原因是①髮量過多②頭髮太細③頭髮太軟④剪髮精密。
68. (3) 直線分法具有①向心感②立體感③強而有力感④離心感。
69. (2) 頭髮具有①使頭皮保持油滑②保護頭部③使頭皮保持乾燥④使頭皮屑增加 的功能。
70. (4) 化粧前宜①去角質②敷臉③按摩④基礎保養 方能達到良好效果。
71. (4) 乾毛巾以何種方法消毒最為適當①來蘇水②漂白水③蒸氣④煮沸。
72. (3) 整髮時決定夾捲方向及長度的是①底盤②髮筒③髮幹④圓環。
73. (2) 將削刀放在髮片內側，由髮根至髮尾削薄髮量，是①外斜削法②內斜削法③大斜削法④右斜削法。
74. (2) 染髮前除了要檢查髮質外還要觀察①頭髮長度②頭皮是否損傷③頭髮粗細④頭髮是否自然捲。
75. (4) ①髮片②馬尾③小髮髻④髮笠 能遮掩大部分的頭髮。
76. (1) 技術人員應努力的目標，不包括①蒐集顧客的私事②學習優雅的談吐③專業技能④關心社會，流行趨勢。
77. (1) 以電棒將髮尾平整夾緊後，往外翻轉定型後的效果為①外翹型②波浪型③內彎型④捲捲型。
78. (2) 使用空調系統，室內外溫度不要相差攝氏①十五度②十度③三度④五度 以上。
79. (1) 表現清純、活潑便於梳理的是①少女髮型②嬉皮髮型③訂婚髮型④新娘髮型。
80. (3) 理燙髮用具每次使用完應擦淨並以①高粱酒②碘酒③酒精④硫酸 消毒後貯存於消毒櫃內。